

Lignes directrices générales du Nouveau-Brunswick

Temps de guérison prévu

INTRODUCTION

Le temps de guérison constitue le délai habituel de réparation des lésions physiologiques consécutives à une blessure ou à une intervention chirurgicale. La durée d'invalidité correspond au délai maximal prévu pour un niveau d'exigences physiques donné (voir la section intitulée « Lignes directrices en matière de durée d'invalidité ») au cours duquel le travailleur devrait avoir récupéré ses capacités fonctionnelles antérieures à l'accident ou à l'intervention chirurgicale. Le temps de guérison est toujours plus long que la durée d'invalidité.

Lorsque le temps de guérison prévu est écoulé, mais que le travailleur est toujours invalide et qu'il se plaint de douleurs, il est possible que cette personne souffre de douleurs chroniques invalidantes.

Les deux tableaux suivants présentent les deux catégories de temps de guérison : temps de guérison prévu et temps de guérison consécutif à une intervention chirurgicale.

TEMPS DE GUÉRISON PRÉVU

Lésions des tissus mous

| | |
|--|------------|
| Lésions des tissus mous | 3 mois |
| Lésions au niveau d'un ligament du genou | 3 mois |
| Hernie discale – traitement conservateur | 3 à 6 mois |

Fractures

| | |
|--|-------------|
| Disjonctions craniofaciales complexes | 4 à 6 mois |
| Membres supérieurs | 3 à 6 mois |
| Fractures de la main | 3 à 6 mois |
| Fractures fermées, vertébrales, par tassement – tous les étages | 3 à 6 mois |
| Fractures / Luxations vertébrales | 12 mois |
| Fractures du bassin – sans réduction | 3 à 6 mois |
| Fractures du bassin – avec réduction | 12 mois |
| Fractures du fémur et de la hanche | 6 à 12 mois |
| Fractures du tibia | 6 à 9 mois |
| Autres fractures des membres inférieurs et du pied | 3 à 6 mois |
| Fractures compliquées | 6 mois |
| Fractures avec luxation des principales articulations (y compris les poignets et les chevilles) | 6 mois |

Infections

| | |
|--------------|------------|
| Ostéomyélite | 4 à 8 mois |
|--------------|------------|

Lésions du système nerveux

| | |
|---|-------------|
| Lésions des nerfs périphériques | 3 à 12 mois |
| Traumatismes crâniens mineurs | 3 mois |
| Lésions cérébrales avec déficit neurologique persistant | 1 an |
| Traumatismes médullaires et de la queue de cheval | 1 an |

TEMPS DE GUÉRISON CONSÉCUTIF À UNE INTERVENTION CHIRURGICALE**Épaule**

| | |
|--|------------|
| Arthroscopie | 3 mois |
| La plupart des autres interventions chirurgicales à l'épaule | 3 à 6 mois |

Genou

| | |
|-------------------------|----------------|
| Arthroscopie | 3 à 6 semaines |
| Arthrotomie | 3 mois |
| Réparation de ligaments | 3 à 6 mois |

Cheville

| | |
|-------------------------|------------|
| Réparation de ligaments | 3 à 6 mois |
|-------------------------|------------|

Colonne vertébrale

| | |
|---|-------------|
| Discectomie | 3 à 6 mois |
| Arthrodèse | 6 à 12 mois |
| Décompression de sténose du canal rachidien | 3 à 12 mois |

Système nerveux

| | |
|--|-------------|
| Réparation nerveuse majeure | 6 à 12 mois |
| Réparation nerveuse mineure | 4 à 5 mois |
| Libération du nerf médian au canal carpien ou d'autres nerfs | 3 mois |

Tendons

| | |
|--|------------|
| Réparation du tendon fléchisseur ou transposition tendineuse | 3 à 6 mois |
| Réparation du tendon extenseur | 3 mois |
| Libération de tendons | 3 mois |

Amputations

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Amputations – membres supérieurs | 3 à 6 mois |
| Amputations – membres inférieurs | 3 à 12 mois |

Reconstruction

| | |
|--------------------------|------------|
| Réimplantation de doigts | 6 à 9 mois |
|--------------------------|------------|